



Recomendaciones

Para tratar de reducir el impacto que la DNC tiene sobre la ganadería, se recomiendan las siguientes actuaciones



Supervisión diaria de los animales, especialmente en los sistemas de producción extensivos.



Atención temprana asegurando disponibilidad diaria de agua y alimentación a los animales afectados clínicamente, evitando que éstos pierdan condición corporal.



Realizar actuaciones de lucha vectorial:

- En la medida de lo posible, mantener a los animales protegidos de los vectores en periodos de alta circulación viral en la zona y/o alta actividad vectorial.
- Desinsectación de instalaciones y medios de transporte en periodos de riesgo, y control de posibles zonas de cría de los vectores
- Empleo de desinsectantes y repelentes en los animales de acuerdo con las pautas establecidas para los mismos.



Tratamiento veterinario lo antes posible desde el inicio de los síntomas, siguiendo las indicaciones y prescripciones individualizadas realizadas por el veterinario para cada ejemplar según su situación clínica.



Mantener al rebaño en buen estado sanitario general. Evitar acumulación de estiércol en el entorno de los animales



Dermatosis Nodular contagiosa

RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS



DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA (DNC)

¡ Protejamos nuestra cabaña ganadera!
Enfermedad emergente del ganado bovino

Dermatosis Nodular Contagiosa



Transmitida por vectores (moscas y mosquitos) y contacto directo o materiales contaminados



Enfermedad de declaración obligatoria.




Afecta a bovinos.

Sobre el virus

El virus pertenece a la familia *Poxviridae*, género *Capripoxvirus*.


Más información:

<https://youtu.be/9N9KOYrROao>




Transmisión

El virus **no se transmite a las personas** por contacto con los animales infectados.
No es una enfermedad zoonótica.



Periodo de incubación


12 días



Vector
NO
contaminado



Vector
NO
contaminado
contacta con
lesiones de
animal
infectado




Vector
contaminado



Infección



Infección



Animal
infectado
contacta con
animal
NO infectado

Se transmite por el contacto con vectores o materiales contaminados, o por contacto directo entre animales infectados y animales sanos.



Signos clínicos

La DNC se presenta con fiebre, nódulos en piel, las mucosas y los órganos internos, aumento de los ganglios linfáticos.

Puede producir esterilidad en machos y muerte, en algunos casos.

El tipo y la gravedad de los síntomas **varían** entre cada explotación afectada y entre cada animal afectado.

Esterilidad temporal o permanente en machos

Fiebre

Ganglios linfáticos agrandados

Lesiones en ubres, disminución de la producción láctea

Pápulas y nódulos en la piel y mucosas de todo el cuerpo



Comunicar el caso

Ante la aparición de estos síntomas es preciso: aislar a los animales sospechosos, llamar a su veterinario clínico y ponerse en contacto con su Unidad Veterinaria.

Se tomarán muestras para confirmar o descartar la enfermedad.

