



SITUACIÓN DEL VIRUS SHAMONDA EN ESPAÑA Y EN LA UE **(22/09/2026)**

El virus Shamonda (SHAV) es un virus perteneciente al género *Orthobunyavirus* y al serogrupo Simbu, grupo en el que también se incluyen otros virus de importancia veterinaria, como el virus de Schmallenberg (SBV) y el virus de Akabane (AKAV). Su transmisión se produce principalmente mediante la picadura de dípteros del género *Culicoides*, que actúan como vectores. No existen evidencias de una transmisión directa significativa entre animales, aunque se ha descrito la posibilidad de transmisión vertical de la madre al feto durante la gestación.

El ganado bovino se considera susceptible tanto a la infección como a la enfermedad clínica. También parecen ser susceptibles de infectarse el ovino y el caprino, aunque sin clínica aparente. En équidos se han detectado animales positivos con sintomatología nerviosa, si bien no se ha podido demostrar hasta el momento una relación causal con los signos clínicos observados.

En ganado bovino, las infecciones agudas pueden cursar principalmente con fiebre, disminución de la producción de leche, entre un 10 y un 20 % durante 7-10 días y diarrea. La morbilidad puede ser muy elevada, llegando a afectar hasta al 100 % de la explotación, si bien la mayoría de los animales adultos parecen recuperarse. También se han descrito repercusiones reproductivas en hembras gestantes, ya que el virus puede atravesar la placenta e infectar al feto, ocasionando abortos o malformaciones fetales graves. Hasta el momento no se ha observado una mortalidad atribuible directamente al virus.

El virus fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en diferentes regiones de África y en Japón.

Durante el verano de 2026 se detectó por primera vez en Europa Central una variante denominada Shamonda-Europe. La primera detección se produjo a finales de julio en Suiza. Desde entonces, se han registrado casos en Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Liechtenstein e Italia.

En Francia, el virus fue identificado mediante RT-PCR a principios de septiembre de 2026, confirmándose en 37 departamentos, en explotaciones de ganado bovino en las que se habían observado animales con signos clínicos:

<https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2026.31.33.2600689>

Se han identificado dos tipos genéticamente diferenciados de virus Shamonda circulando en Europa:

- Shamonda tipo 1, detectado principalmente en Suiza, Francia, sur de Alemania y Austria.
- Shamonda tipo 2, detectado en Bélgica, Países Bajos, norte de Alemania y noroeste de Francia.

En **España**, el **Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete**, Laboratorio Nacional de Referencia, ha confirmado la detección del **virus Shamonda tipo 1** en 7 explotaciones de ganado bovino, en las provincias de **Córdoba y Toledo**.

Las explotaciones afectadas han presentado sintomatología compatible en línea con la reportada por otros países previamente: fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea.

Actualmente se están analizando más sospechas clínicas en otras regiones de España.

Se puede encontrar más información sobre el virus de Shamonda en la página del MAPA dedicada a la enfermedad:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/virus_shamonda